单核细胞/高密度脂蛋白比值 与脑小血管病的相关性分析

姬 燕 杨荣礼 吕金峰 谢 翼 丁 鑫

摘要 **目的** 探讨单核细胞/高密度脂蛋白比值(monocyte/high density lipoprotein ratio, MHR)与脑小血管病(cerebral small-vessel disease, CSVD)的相关性。**方法** 选取CSVD患者400例(观察组)以及同期住院的非CSVD患者200例(对照组)作为研究对象。根据CSVD负荷评分,将观察组患者分为轻度组(155例)、中度组(117例)和重度组(128例)。比较各组间临床资料、实验室检查结果的区别。**结果** 观察组MHR、同型半胱氨酸(HCY)、纤维蛋白原(FIB)水平高于对照组,高密度脂蛋白(HDL)水平低于对照组($P < 0.05$)。重度组高血压比例、年龄、MHR、HCY、FIB水平高于轻度组,HDL水平低于轻度组($P < 0.05$)。多因素Logistic回归分析结果显示,MHR、HCY、FIB是发生CSVD的危险因素,HDL是发生CSVD的保护因素($P < 0.05$)。高血压、年龄、MHR、HCY、FIB是影响CSVD患者严重程度的危险因素,HDL是影响CSVD患者严重程度的保护因素($P < 0.05$)。MHR预测CSVD的ROC曲线下面积为0.797(95% CI:0.763~0.829, $P = 0.000$),敏感度和特异性分别为69.25%和78.00%。**结论** MHR是CSVD患者及严重程度的独立危险因素,且MHR对CSVD具有一定的诊断价值。

关键词 脑小血管病 单核细胞/高密度脂蛋白比值 炎症

中图分类号 R743.9

文献标识码 A

DOI 10.11969/j.issn.1673-548X.2021.11.030

Correlation between Monocyte/high-density Lipoprotein Ratio and Cerebral Small-vessel Disease. Ji Yan, Yang Rongli, Lv Jinfeng, et al. Graduate School of Xuzhou Medical University, Jiangsu 221004, China

Abstract Objective To explore the correlation between MHR and CSVD. **Methods** A total of 400 patients with CSVD (the observation group) and 200 patients with non-CSVD (the control group) were selected as the research objects. According to CSVD load score, the patients were divided into mild group (155 cases), moderate group (117 cases) and severe group (128 cases). Clinical data and laboratory examination results were compared between each group. **Results** The levels of MHR, homocysteine (Hcy) and fibrinogen (FIB) in observation group were higher than those in control group, and the levels of high-density lipoprotein (HDL) were lower than those in control group ($P < 0.05$). The proportion of hypertension, age, MHR, HCY and FIB in severe group were higher than those in mild group, and the level of HDL was lower than that in mild group ($P < 0.05$). Multivariate Logistic regression analysis showed that MHR, HCY and FIB were risk factors for CSVD, and HDL was a protective factor for CSVD ($P < 0.05$). Hypertension, age, MHR, Hcy and FIB were risk factors affecting the severity of CSVD patients, while HDL was a protective factor affecting the severity of CSVD patients ($P < 0.05$). MHR predicted the area under the ROC curve for CSVD to be 0.797 (95% CI: 0.763 - 0.829, $P = 0.000$), with sensitivity and specificity of 69.25% and 78.00%, respectively. **Conclusion** MHR is an independent risk factor for patients and severity of CSVD, and MHR has certain diagnostic value for CSVD.

Key words Cerebral small-vessel disease; Monocyte/high-density lipoprotein ratio; Inflammation

脑小血管病(cerebral small-vessel disease, CSVD)是指由于脑血管和脑实质结构改变所引起的各种临床表现、病理过程、神经影像学特征的综合征。在所有缺血性脑血管疾病中,CSVD占缺血性脑卒中的25%,而且CSVD也使患者发生脑卒中的风险增

加。此外,CSVD是老年人功能丧失、残疾和认知能力下降的主要原因^[1]。

单核细胞/高密度脂蛋白比值(monocyte/high density lipoprotein ratio, MHR)是近年来发现的一种新的炎性标志物^[2,3]。单核细胞作为一种独特的白细胞参与了炎性反应的各个阶段,在炎性反应中起到了非常重要的作用^[4]。相反,高密度脂蛋白主要通过逆向转运胆固醇,阻止单核细胞黏附在动脉壁上,减少内皮细胞黏附分子的转运和表达从而达到抗炎、

作者单位:221004 徐州医科大学研究生院(姬燕、吕金峰、谢翼、丁鑫);221006 徐州医科大学附属医院老年医学科(杨荣礼)

通讯作者:杨荣礼,教授,硕士生导师,电子信箱:yl6502@sina.com

com

抗动脉粥样硬化的特性^[5]。因此 MHR 是一个综合了炎症与血脂的指标,与全身性炎症和血管内皮功能障碍有关。已有证据表明,炎症是脑小血管病的发病机制之一,在 CSVD 发生、发展中发挥重要作用^[6]。目前关于 MHR 的研究多集中在冠心病、脑卒中、糖尿病并发症等方面,较少在 CSVD 中进行相关研究^[7-9]。因此本研究主要探讨了 MHR 与脑小血管病患者及其严重程度的相关性,旨在为脑小血管病患者的早期预防及诊疗提供参考。

对象与方法

1. 研究对象:选取 2018 年 9 月~2020 年 9 月徐州医科大学附属医院神经内科收治的 CSVD 患者 400 例作为观察组,对照组随机选取同期住院且符合排除标准的非 CSVD 患者 200 例。观察组入选标准:①符合脑小血管病诊断标准^[10];②行脑部磁共振(MRI)的检查,MRI 上至少有 1 种典型 CSVD 表型;③年龄 ≥ 50 岁。排除标准:①既往有颅内、外大血管病变、颅脑外伤、颅内肿瘤、合并大面积脑梗死、脑出血病史等;②机体有急性或慢性炎症者;③恶性肿瘤,有严重的脏器衰竭;④自身免疫性疾病、中毒、脱髓鞘疾病、遗传变性、脑积水等明确原因所引起的影像学改变;⑤服用降脂药者。

2. 数据收集:记录患者性别、年龄、是否合并高血压、糖尿病以及实验室检查(包括血常规、血脂、FIB、HCY)等。实验室检查项目采集受试者空腹静脉血,并计算 MHR($MHR = \text{单核细胞} / \text{高密度脂蛋白}$)。

3. 影像学检查:总 CSVD 负荷评分标准如下:(1)腔隙:定义为一个圆形或卵圆形、皮质下充满液体的空洞(信号类似脑脊液), T_1 加权为低信号, T_2 加权为高信号,直径 $\geq 3\text{mm}$ 、 $< 15\text{mm}$ 的病灶。(2)脑微出血:在 GRE 图像上表现为 $< 10\text{mm}$ 的点状低信号病

变。(3)脑白质高信号:脑室周围或深部脑白质高信号依据 Fazekas 评分系统确定脑白质高信号的程度。脑室周围脑白质 Fazekas 评分为 3 分或深部脑白质 ≥ 2 分提示高级别脑白质病变。(4)血管周围间隙:定义为基底节区 T_2 加权成像上 $< 3\text{mm}$ 的点状和(或)线状高信号病变。基底节区 2~4 级 PVS 被定义为高级别血管周围间隙。根据上述 4 种头颅 MRI 的影像学标志物,每项达到标准计 1 分,CSVD 总负荷评定为 0~4 分^[11]。根据总 CSVD 得分将患者分为 3 组:轻度组(0~1 分)、中度组(2 分)、重度组(3~4 分)。所有获得的影像学图像均由两名神经影像学专家采取完全随机阅读的方式对影像资料按照 CSVD 专家共识进行盲审,如有意见不统一,则共同商议决定^[10]。

4. 统计学方法:采用 IBM SPSS 25.0 统计学软件对数据进行统计处理。服从正态分布的计量资料以均数 $\pm$ 标准差($\bar{x} \pm s$)表示,两组间均数比较采用 t 检验,3 组间比较采用单因素方差分析;不服从正态分布的计量资料以中位数(四分位数间距) [$M(Q1, Q3)$] 表示,组间比较采用 *Kruskal - Wallis* 检验。计数资料以例数(百分数) [$n(\%)$] 表示,组间比较采用 χ^2 检验。采用 Logistic 回归分析探究影响 CSVD 患者及其严重程度的因素。ROC 曲线分析 MHR 指标在判定 CSVD 的敏感度、特异性及临界值,以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

结 果

1. 对照组与观察组临床资料比较:两组患者年龄、性别、高血压比例、糖尿病比例比较,差异无统计学意义($P > 0.05$);两组患者单核细胞与高密度脂蛋白比值(MHR)、单核细胞(M)、高密度脂蛋白(HDL)、同型半胱氨酸(HCY)、纤维蛋白原(FIB)比较,差异有统计学意义($P < 0.05$,表 1)。

表 1 两组患者临床资料比较 [$n(\%)$, $\bar{x} \pm s$, $M(Q1, Q3)$]

项目	对照组 ($n = 200$)	病例组 ($n = 400$)	t/χ^2	P
男性	95(47.5)	216(54.0)	2.256	0.133
年龄(岁)	59.06 $\pm$ 4.29	59.63 $\pm$ 6.77	-1.234	0.214
高血压	91(45.5)	214(53.5)	4.000	0.093
糖尿病	36(18.0)	85(21.3)	0.875	0.350
M($\times 10^9/L$)	0.25(0.19,0.29)	0.34(0.28,0.42)	-12.120	0.000
HCY(mmol/L)	10.20(9.05,12.56)	11.85(9.87,14.56)	-5.003	0.000
HDL(mmol/L)	1.26(1.12,1.51)	1.19(1.00,1.37)	-4.624	0.000
FIB(mmol/L)	2.50 $\pm$ 0.55	2.83 $\pm$ 0.79	-5.414	0.000
MHR($\times 10^9/\text{mmol}$)	0.20 $\pm$ 0.07	0.32 $\pm$ 0.13	-11.881	0.000

2. 按严重程度分组的3组患者的临床资料比较;3组患者性别、糖尿病比例比较,差异无统计学意义($P >$

0.05);3组患者高血压比例、年龄、MHR、M、HDL、HCY、FIB比较,差异有统计学意义($P < 0.05$,表2)。

表2 CSVD患者轻度组、中度组和重度组的临床资料比较[$n(\%)$, $\bar{x} \pm s$, $M(Q1, Q3)$]

项目	轻度组($n = 155$)	中度组($n = 117$)	重度组($n = 128$)	F/χ^2	P
男性	80(51.6)	65(55.6)	71(55.5)	0.581	0.759
年龄(岁)	56.19 ± 5.37	60.52 ± 6.56*	62.97 ± 6.57*	46.644	0.001
高血压	58(37.4)	69(59.0)*	87(68.0)*	30.805	0.000
糖尿病	25(16.1)	29(24.8)	31(24.2)	3.977	0.140
M($\times 10^9/L$)	0.31(0.25,0.36)	0.32(0.27,0.37)	0.43(0.37,0.50)*#	44.644	0.001
HCY(mmol/L)	12.05 ± 4.78	13.19 ± 6.34	14.76 ± 6.21*	20.616	0.000
HDL(mmol/L)	1.30 ± 0.31	1.22 ± 0.29	1.10 ± 0.25*#	31.954	0.000
FIB(g/L)	2.66 ± 0.75	2.83 ± 0.71	3.01 ± 0.86*#	8.603	0.000
MHR($\times 10^9/mmol$)	0.25 ± 0.08	0.28 ± 0.10	0.43 ± 0.12*#	147.970	0.000

与轻度组比较,* $P < 0.05$;与中度组比较,# $P < 0.05$

3. 观察组发生CSVD的影响因素分析:以发生CSVD为因变量,以单因素分析中差异有统计学意义的指标为自变量进行多因素 Logistic 回归分析。

MHR、FIB、HCY是发生CSVD的危险因素,HDL是发生CSVD的保护因素($P < 0.05$,表3)。

表3 CSVD的多因素 Logistic 回归分析

项目	β	SE	Wald χ^2	P	OR	95% CI
MHR	0.695	0.193	12.943	0.000	2.004	1.372 ~ 2.927
FIB	0.439	0.169	6.717	0.010	1.551	1.113 ~ 2.161
HCY	0.065	0.020	10.395	0.001	1.067	1.026 ~ 1.109
HDL	-1.235	0.290	18.132	0.000	0.291	0.165 ~ 0.514
常量	-5.171	0.852	36.829	0.000	0.006	-

4. CSVD患者严重程度的影响因素分析:以CSVD的严重程度为因变量,以单因素分析中差异有统计学意义的指标为自变量进行有序 Logistic 回归分

析。MHR、高血压、年龄、FIB、HCY是影响CSVD患者严重程度的危险因素,HDL是影响CSVD患者严重程度的保护因素($P < 0.05$,表4)。

表4 影响CSVD严重程度的有序 Logistic 回归分析

项目	β	SE	Wald χ^2	P	OR	95% CI
MHR	1.497	0.161	86.216	0.000	4.467	3.257 ~ 6.126
高血压	0.461	0.220	4.403	0.036	1.586	1.442 ~ 3.623
年龄	0.005	0.002	7.918	0.005	1.005	1.002 ~ 1.009
FIB	0.434	0.151	8.219	0.004	1.544	1.147 ~ 2.077
HCY	0.047	0.022	4.540	0.033	1.048	1.004 ~ 1.094
HDL	-2.089	0.638	10.727	0.001	0.124	0.035 ~ 0.432
常量	-4.705	1.073	19.234	0.000	0.009	-

5. MHR对CSVD的评估价值:ROC曲线分析结果显示,MHR的ROC曲线下面积为0.797(95%CI:0.763 ~ 0.829, $P = 0.000$),当分界值为0.24时,敏感度和特异性分别为69.25%和78.00%(图1)。

讨 论

随着神经影像学技术的发展和普及,大量CSVD

病例被识别和发现,日益受到临床医生的重视。目前,CSVD的发生机制尚不明确,相关研究认为炎症反应、弥漫性血管内皮损伤是引起CSVD的主要病理机制。炎症反应主要通过介导内皮功能障碍、破坏紧密连接蛋白、重塑细胞外基质、激活胶质细胞等途径参与到CSVD的发生、发展过程中^[12]。

图1 MHR诊断CSVD的ROC曲线

单核细胞参与促炎性细胞因子的释放,激活的单核细胞通过调节炎性细胞因子介导炎症与氧化应激过程,同时也参与机体内源性炎症反应^[13]。Rouhl等^[14]研究发现,单核-吞噬细胞的活化标志物新蝶呤在CSVD患者中表达增高,表明活化的单核-吞噬细胞在CSVD的病理生理中发挥重要作用。随年龄增加,单核细胞对炎症的抵抗力下降,且会向炎症表型转化。位于中枢神经系统的小胶质细胞来源于单核细胞,小胶质细胞/巨噬细胞的激活会释放蛋白酶和自由基,参与CSVD的炎症过程,对细胞外基质和神经血管单元产生不可逆性损害^[15]。而HDL及其主要蛋白质成分载脂蛋白A1抑制CD11b的激活,通过单核细胞抑制炎症反应。低HDL水平可诱导单核细胞CD16水平上调,进而导致促炎型单核细胞水平升高^[16]。也有相关研究表明,CSVD患者HDL水平较无CSVD患者降低。王亚男等^[17]关于脑小血管病患者认知功能的相关性研究中说明认知功能受损的CSVD患者中HDL水平显著低于对照组,且HDL是CSVD患者认知功能障碍的保护因素。本研究结果也表明,CSVD患者HDL较对照组降低且是CSVD患者及严重程度的保护因素。目前关于HDL与CSVD的研究较少,推测HDL参与CSVD的机制可能是由于其具有保护血管内皮、抵抗炎症等作用。MHR结合了两种常规的生物学指标,被认为是一种可以反映体内炎症的生物学标志物。本研究将MHR作为一种炎性标志物与CSVD的发病机制相联系。同时MHR也与动脉粥样硬化性疾病相关,CSVD与动脉粥样硬化有共同的危险因素。多因素Logistic回归分析表明,MHR是CSVD的危险因素。ROC曲线显示MHR的ROC曲线下面积为0.797(95%CI:0.763~0.829, $P=0.000$),敏感度和特异性分别为69.25%

和78.00%,具有良好的诊断价值。

由于CSVD相对于普通卒中临床症状轻、病死率低,CSVD的发生常被忽视,特别是在早期。因此,神经影像学已经成为诊断CSVD和无症状神经血管疾病的重要工具。CSVD患者常表现为多种影像学表型共存^[18]。本研究参照相关文献对CSVD的影像学特征进行评估,获得总CSVD负荷评分。该评分用来评估CSVD对大脑的整体影响,而不是只单独评估其中一种影像学表现,有助于CSVD的量化和分层。高CSVD负荷可导致神经血管网络受损、神经退行性病变,对脑卒中后恢复及预后产生不利影响^[19]。本研究结果显示,MHR是影响CSVD患者严重程度的危险因素,MHR值越高,可能预示着CSVD患者的临床症状可能会更严重。在CSVD患者中应关注此生物学标志物,以期在早期阶段通过目前调脂方面使用广泛的他汀类药物、HDL-C靶向治疗及抗炎等相关治疗措施进行干预,延缓CSVD的进展,提高患者的生存质量。

目前研究较多的CSVD相关炎性标志物主要包括C反应蛋白、肿瘤坏死因子- α 、白细胞介素6、脂蛋白相关磷脂酶A₂等炎性细胞因子。但是传统炎性标志物的成本高,难以解释异常结果以及可能的进一步检测限制了其临床应用。而MHR可以通过常规检查的白细胞亚群、高密度脂蛋白胆固醇计算出来,是容易获得的炎性标志物,具有更广泛的应用。

综上所述,MHR升高是CSVD患者及严重程度的独立危险因素,且MHR对CSVD具有一定的诊断价值。但本研究是单中心回顾性研究,未来还需多中心、前瞻性研究进一步探讨MHR与CSVD患者的关系。

参考文献

- 1 Wardlaw JM, Smith C, Dichgans M. Small vessel disease: mechanisms and clinical implications[J]. *Lancet Neurol*, 2019, 18(7): 684-696
- 2 Yalinbas YD, Eroglu S, Sariakcali B, et al. The usefulness of monocyte-to-high density lipoprotein and neutrophil-to-lymphocyte ratio in diabetic macular edema prediction and early anti-VEGF treatment response[J]. *Ocul Immunol Inflamm*, 2021, 7: 1-6
- 3 Sigirci S, Ser S, Keskin K, et al. Comparing the prognostic value of hematological indices in patients with ST segment elevation myocardial infarction: "ahead to head" analysis[J]. *Angiology*, 2021, 72(4): 348-354
- 4 Hoyer FF, Giesen MK, NunesFrana C, et al. Monocytic microparticles promote atherogenesis by modulating inflammatory cells in mice[J]. *J Cell Mol Med*, 2012, 16(11): 2777-2788

(下转第150页)

- 18 Chen NX, O'Neill KD, Moe SM. Matrix vesicles induce calcification of recipient vascular smooth muscle cells through multiple signaling pathways[J]. *Kidney Int*, 2018, 93(2): 343 - 354
- 19 Chavez MB, Kolli TN, Tan MH, *et al.* Loss of discoidin domain receptor 1 predisposes mice to periodontal breakdown[J]. *J Dent Res*, 2019, 98(13): 1521 - 1531
- 20 Krohn JB, Hutcheson JD, Martínez - Martínez E, *et al.* Discoidin domain receptor - 1 regulates calcific extracellular vesicle release in vascular smooth muscle cell fibrocalcific response via transforming growth factor - β signaling [J]. *Arterioscler Thromb Vasc Biol*, 2016, 36(3): 525 - 533
- 21 de la Cuesta F, Passalacqua I, Rodor J, *et al.* Extracellular vesicle cross - talk between pulmonary artery smooth muscle cells and endothelium during excessive TGF - β signalling: implications for PAH vascular remodeling[J]. *Cell Commun Signal*, 2019, 17(1): 143
- 22 Mansour A, Darwiche W, Yaker L, *et al.* GFOGER peptide modifies the protein content of extracellular vesicles and inhibits vascular calcification[J]. *Front Cell Dev Biol*, 2020, 8: 589761
- 23 Bhat OM, Yuan X, Camus S, *et al.* Abnormal lysosomal positioning and small extracellular vesicle secretion in arterial stiffening and calcification of mice lacking mucolipin 1 gene[J]. *Int J Mol Sci*, 2020, 21(5): 1713
- 24 Bhat OM, Yuan X, Cain C, *et al.* Medial calcification in the arterial wall of smooth muscle cell - specific Smpd1 transgenic mice; a ceramide - mediated vasculopathy [J]. *J Cell Mol Med*, 2020, 24(1): 539 - 553
- 25 Bhat OM, Li G, Yuan X, *et al.* Arterial medial calcification through enhanced small extracellular vesicle release in smooth muscle - specific Asah1 gene knockout mice [J]. *Sci Rep*, 2020, 10(1): 1645
- 26 何阳, 崔星刚, 李波, 等. CD137 - CD137L 信号通路通过 Rab7 分子调控自噬影响小鼠血管平滑肌细胞外泌体分泌 [J]. *中华心血管病杂志*, 2019, 47(10): 829 - 835
- 27 王宁, 崔星钢, 杨萍, 等. CD137 信号通过外泌体传递活化 T 细胞核因子 c1 介导小鼠血管平滑肌细胞钙化 [J]. *中国动脉硬化杂志*, 2018, 26(12): 1194 - 1200
- 28 Xu F, Zhong JY, Lin X, *et al.* Melatonin alleviates vascular calcification and ageing through exosomal miR - 204/miR - 211 cluster in a paracrine manner [J]. *J Pineal Res*, 2020, 68(3): e12631
- 29 Li S, Zhan JK, Wang YJ, *et al.* Exosomes from hyperglycemia - stimulated vascular endothelial cells contain versican that regulate calcification/senescence in vascular smooth muscle cells [J]. *Cell Biosci*, 2019, 9: 1
- 30 Lin X, Li S, Wang YJ, *et al.* Exosomal notch3 from high glucose - stimulated endothelial cells regulates vascular smooth muscle cells calcification/aging [J]. *Life Sci*, 2019, 232: 116582
- (收稿日期: 2021 - 03 - 06)
- (修回日期: 2021 - 05 - 22)
- (上接第 136 页)
- 5 Rader DJ, Hovingh GK. HDL and cardiovascular disease [J]. *Lancet*, 2014, 384(9943): 618 - 625
- 6 Low A, Mak E, Rowe JB, *et al.* Inflammation and cerebral small vessel disease: a systematic review [J]. *Aging Res Rev*, 2019, 53(7): 100916
- 7 Villanueva DLE, Tiongson MD, Ramos JD, *et al.* Monocyte to high - density lipoprotein ratio (MHR) as a predictor of mortality and major adverse cardiovascular events (MACE) among ST elevation myocardial infarction (STEMI) patients undergoing primary percutaneous coronary intervention: a Meta - analysis [J]. *Lipids Health Dis*, 2020, 19(1): 55
- 8 Liu H, Liu K, Pei L, *et al.* Monocytetohigh - density lipoprotein ratio predicts the outcome of acute ischemic stroke [J]. *J Atheroscler Thromb*, 2020, 27(9): 959 - 968
- 9 YalinbasYeter D, Eroglu S, Sariakcali B, *et al.* The usefulness of monocytetohigh - density lipoprotein and neutrophiltolymphocyte ratio in diabetic macular edema prediction and early anti - VEGF treatment response [J]. *Ocul Immunol Inflamm*, 2021, 217(3): 1 - 6
- 10 中华医学会神经病学分会, 中华医学会神经病学分会脑血管病学组. 中国脑小血管病诊治共识 [J]. *中华神经科杂志*, 2015, 48(10): 838 - 844
- 11 Amin Al Olama A, Wason JMS, Tuladhar AM, *et al.* Simple MRI score aids prediction of dementia in cerebral small vessel disease [J]. *Neurology*, 2020, 94(12): e1294 - e1302
- 12 Grochowski C, Litak J, Kamieniak P, *et al.* Oxidative stress in cerebral small vessel disease. Role of reactive species [J]. *Free Radic Res*, 2018, 52(1): 1 - 13
- 13 Xiong H, Pamer EG. Monocytes and infection: modulator, messenger and effector [J]. *Immunobiology*, 2015, 220(2): 210 - 214
- 14 Rouhl RP, Damoiseaux JG, Lodder J, *et al.* Vascular inflammation in cerebral small vessel disease [J]. *Neurobiol Aging*, 2012, 33(8): 1800 - 1806
- 15 Plaza - Zabala A, Sierra - Torre V, Sierra A. Autophagy and microglia: novel partners in neurodegeneration and aging [J]. *Int J Mol Sci*, 2017, 18(3): 598
- 16 Hu J, Xi D, Zhao J, *et al.* High - density lipoprotein and inflammation and its significance to atherosclerosis [J]. *Am J Med Sci*, 2016, 352(4): 408 - 415
- 17 王亚男, 刘敬, 孙锦平, 等. 脑小血管病患者认知功能与同型半胱氨酸及高密度脂蛋白水平的相关性研究 [J]. *中华老年心脑血管病杂志*, 2021, 23(1): 17 - 19
- 18 Chen X, Wang J, Shan Y, *et al.* Cerebral small vessel disease: neuroimaging markers and clinical implication [J]. *J Neurol*, 2019, 266(10): 2347 - 2362
- 19 Amin Al Olama A, Wason JMS, Tuladhar AM, *et al.* Simple MRI score aids prediction of dementia in cerebral small vessel disease [J]. *Neurology*, 2020, 94(12): e1294 - e1302
- (收稿日期: 2021 - 06 - 06)
- (修回日期: 2021 - 06 - 20)